



NVS Magneten



Magneet gebruik: Wat kun je er allemaal mee?

- De stimulator aanzetten (60 sec.)
 - Meestal voor, tijdens en na een aanval
- Stimulator uitzetten
 - Meestal voor het sporten of indien bijwerkingen kortdurend hinder opleveren
- Stimulator testen
 - Ter controle of de stimulator het nog doet


Magneet gebruik: Voor, tijdens en na een aanval

STIMULATOR AANZETTEN

- Je zet met de magneet de stimulator gedurende één minuut aan
- Wanneer?
 - Voor een aanval
 - Tijdens een aanval
 - Na een aanval
- Waarom?
 - Om een aanval te voorkomen of te doen stoppen,
 - De duur en hevigheid van een aanval te verminderen,
 - De periode na de aanval (post-ictale fase) te veraangename.
- Hoe vaak?
 - Niet meer dan 480 keer per dag
- Hoe?
 - Dit kan op verschillende manieren, zoals


Magneet gebruiken: Hoe doen we dat?

STIMULATOR AANZETTEN MET DE ZIGZAG METHODE




Magneet gebruiken: Hoe doen we dat?

STIMULATOR AANZETTEN MET DE KRUIS METHODE



Magneet gebruiken: Hoe doen we dat?


STIMULATOR AANZETTEN MET DE VEEG METHODE



Magneetgebruik: (tijdelijk) Uitzetten van de stimulator

STIMULATOR UITZETTEN


- Uitzetten van de stimulator
 - Bij sporten (bv. om kortademigheid te voorkomen)
 - Bij bijwerkingen die hinderlijk zijn (bv. heesheid tijdens zingen)
 - Bij pijn (bv. pijn in de nek / hals, bij de stimulator)
 - Dit zowel tijdens - als tussen de stimulaties door, dan ook de arts waarschuwen!
- Hoe stopzetten?
 - Door de magneet boven op de stimulator te leggen en op de huid vast te zetten met tape, pleister of fixovlies



Magneetgebruik: (tijdelijk) Uitzetten van de stimulator

STIMULATOR UITZETTEN

- Bij het gebruik van pleisters / smal tape: twee pleisters kruislings over de magneet en een pleister horizontaal onderlangs (om te voorkomen dat de magneet zakt)



- Voor het uitzetten van de stimulator kan de magneet ook in de kleding (strak t-shirt / bh) genaaid worden.